

Une nouvelle Blattide [ORTH.] du houiller de Liévin (Pas de-Calais)

par FERNAND MEUNIER.

Parmi quelques insectes primaires de la collection de l'École des mines de Paris, soumis à mon examen par M. le Prof. H. Douvillé, j'ai observé une superbe empreinte de Blattide provenant des schistes de Liévin.

Sysciophlebia reticulata, nov. sp. — L'élytre de ce nomoneure a 23 mill. de longueur et 10 mill. de largeur. La médiastine (sous-costale) n'atteint pas le milieu du bord costal et comprend sept ner-



Fig. 1. — *Sysciophlebia reticulata* F. Meunier
(cliché de M. Verheyen d'Anvers).

vures distinctement inclinées : les cinq premières sont fourchues, les deux autres simples. Vraisemblablement, il devait y en avoir encore une ou deux à la base de l'élytre qui est altérée par la fossilisation. L'espace entre la nervure médiastine et la scapulaire (radiale), celui entre cette dernière et l'externo-médiaire (médiane) est

plus large que celui se trouvant entre l'externo-médiaire et l'interno-médiaire (cubitale). La nervure scapulaire (radiale) présente deux branches : le rameau antérieur de la première a une fourche, le postérieur deux ; le rameau antérieur de la seconde branche a trois fourches, dont les deux premières sont environ d'égale longueur, la troisième est un peu plus petite que les deux autres ; le rameau postérieur est longuement fourchu. Le champ (secteur) de la scapulaire a donc sept fourches. La nervure externo-médiaire (médiane) a aussi deux branches : son rameau antérieur n'a qu'une fourche, le postérieur est large et en présente deux. L'interno-médiaire (cubitale) a huit nervures dont les cinq premières simples, la sixième et la septième, de même longueur, sont fourchues ; la huitième est simple. Nervure anale bien ac-

cusée. Champ anal ayant quatre nervures : la première est fourchue, les autres sont simples.

Tout le champ de l'élytre est orné d'une fine réticulation le faisant paraître comme chagriné.




Fig. 2. — Restauration de l'élytre (aile antérieure) de ce Blattide.
 A-B. Secteur (champ) de la mediastine (sous-costale).
 C-D. Secteur de la scapulaire (radiale).
 E-F. Secteur de l'externo-médiaire (médiane).
 G-H. Secteur de l'interno-médiaire (cubitale).
 i. Nervure anale.
 au. Nervures anales (anal veins).

Cette espèce a été découverte dans la fosse n° 3 du houiller de Lievin. Dans la collection de l'École des Mines, elle portait le nom de *Etoblattina Zeileri* Brongniart *in litt.*

Un nouveau Myriapode français

par H.-W. BRÖLEMANN.

Dans la *Feuille des Jeunes Naturalistes* n° 335, septembre 1898, p. 201, nous signalions la présence de *Stigmatogaster gracilis* à Alusquy, canton d'Ustarrila (Basses-Pyrénées). Il s'agit là d'une erreur qu'il importe de rectifier. Les échantillons étaient jeunes et prêtaient jusqu'à un certain point à une confusion. La découverte toute récente (mars 1907) d'une femelle adulte et d'une femelle jeune à Arudy (près de Pan), suivie